

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Cirio Rojo

Tamaño: Medio y grande.

Forma: Más alta que ancha, ventruda hacia su base y estrechándose en la parte superior, en algunos frutos se comprime formando cuello antes de llegar a su ápice. También hay frutos totalmente cilíndricos.

Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, profunda. Bordes irregulares con un lado más bajo que otro. Chapa ruginosa en el fondo. **Pedúnculo:** Corto, muy hundido o rozando suavemente los bordes.

Cavidad del ojo: Medianamente estrecha o amplia y de profundidad variable. Fondo con arrugado suave y bordes ondulados, marcando a veces cinco mamelones. **Ojo:** Cerrado o semi-cerrado. Sépalos más bien largos, puntiagudos, compactos en su base o separados. En conjunto de aspecto característico.

Piel: Fuerte y lisa. **Color:** Amarillo con reflejos verdosos y chapa rojo claro con pinceladas de tono más fuerte que, a veces, es tan intenso el colorido que tan apenas se perciben. Punteado blanco, visible sobre la chapa y a veces entremezclado de puntos ruginosos.

Tubo del cáliz: Triangular, alargado o en embudo con tubo corto y fusiforme. Estambres por la mitad.

Corazón: Alargado, más cerca del pedúnculo, bien delimitado en los dos polos. Eje abierto o agrietado. Celdas alargadas, cartilaginosas, con rayas suaves de lanosidad que casi siempre quedan pegadas a las semillas.

Semillas: Variadas en cuanto a tamaño, aunque casi siempre grandes y puntiagudas.

Carne: Color blanco-crema con fibras verdosas, a veces con suave reflejo rosado. Firme y jugosa. **Sabor:** Característico. Bueno.

Maduración: Invierno.

